Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
Факультет “Фундаментальные науки”
Кафедра “Высшая математика”

Математический анализ

Модуль 2. Пределы и непрерывность функций одной переменной

Лекция 2.5

к.ф.-м.н. Семакин А.Н.



Свойства функций, непрерывных в точке



Свойства функций, непрерывных в точке

*Теорема (локальная ограниченность непрерывной функции)**



Свойства функций, непрерывных в точке

*Теорема (локальная ограниченность непрерывной функции)**
Если $f(x) \in C(a)$, то существует такая окрестность точки a, в которой функция $f(x)$ ограничена.



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

$f(x) \in C(a)$



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

$f(x) \in C(a) \Rightarrow$ по эквивалентному определению непрерывности функции имеем



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

$f(x) \in C(a) \Rightarrow$ по эквивалентному определению непрерывности функции имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 \ \forall x \in R, |x - a| < \delta: \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

$f(x) \in C(a) \Rightarrow$ по эквивалентному определению непрерывности функции имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 \ \forall x \in R, |x - a| < \delta: \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Пусть $\varepsilon = 1$.



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

$f(x) \in C(a) \Rightarrow$ по эквивалентному определению непрерывности функции имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \; \forall x \in R, |x - a| < \delta: \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Пусть $\varepsilon = 1$. Тогда



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

$f(x) \in C(a) \Rightarrow$ по эквивалентному определению непрерывности функции имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \; \forall x \in R, |x - a| < \delta: \; |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Пусть $\varepsilon = 1$. Тогда

$$\forall x \in R, |x - a| < \delta: \; |f(x) - f(a)| < 1.$$



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

$f(x) \in C(a) \Rightarrow$ по эквивалентному определению непрерывности функции имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \; \forall x \in R, |x - a| < \delta: \; |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Пусть $\varepsilon = 1$. Тогда

$$\forall x \in R, |x - a| < \delta: \; |f(x) - f(a)| < 1.$$

$$\Rightarrow -1 < f(x) - f(a) < 1$$



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

$f(x) \in C(a) \Rightarrow$ по эквивалентному определению непрерывности функции имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \; \forall x \in R, |x - a| < \delta: \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Пусть $\varepsilon = 1$. Тогда

$$\forall x \in R, |x - a| < \delta: \; |f(x) - f(a)| < 1.$$

$$\Rightarrow -1 < f(x) - f(a) < 1$$

$$\Rightarrow f(a) - 1 < f(x) < f(a) + 1.$$



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

$f(x) \in C(a) \Rightarrow$ по эквивалентному определению непрерывности функции имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \; \forall x \in R, |x - a| < \delta: \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Пусть $\varepsilon = 1$. Тогда

$$\forall x \in R, |x - a| < \delta: \; |f(x) - f(a)| < 1.$$

$$\Rightarrow -1 < f(x) - f(a) < 1$$

$$\Rightarrow f(a) - 1 < f(x) < f(a) + 1.$$

$\Rightarrow \exists U(a)$, в которой функция ограничена. ■



Свойства функций, непрерывных в точке

*Теорема (локальное знакопостоянство непрерывной функции)**



Свойства функций, непрерывных в точке

*Теорема (локальное знакопостоянство непрерывной функции)**
Если $f(x) \in C(a)$ и $f(a) \neq 0$, то в некоторой окрестности точки a функция сохраняет свой знак.



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

Рассмотрим случай $f(a) > 0$.



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

Рассмотрим случай $f(a) > 0$.

$f(x) \in C(a)$



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

Рассмотрим случай $f(a) > 0$.

$f(x) \in C(a) \Rightarrow$

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \; \forall x \in R, |x - a| < \delta$:

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

Рассмотрим случай $f(a) > 0$.

$f(x) \in C(a) \Rightarrow$

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \; \forall x \in R, |x - a| < \delta$:

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Пусть $\varepsilon = f(a)$.



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

Рассмотрим случай $f(a) > 0$.

$f(x) \in C(a) \Rightarrow$

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \; \forall x \in R, |x - a| < \delta$:

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Пусть $\varepsilon = f(a)$. Тогда



Свойства функций, непрерывных в точке

Доказательство

Рассмотрим случай $f(a) > 0$.

$f(x) \in C(a) \Rightarrow$

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \; \forall x \in R, |x - a| < \delta$:

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Пусть $\varepsilon = f(a)$. Тогда

$\forall x \in R, |x - a| < \delta$: $|f(x) - f(a)| < f(a)$.



Свойства функций, непрерывных в точке

$$\Rightarrow -f(a) < f(x) - f(a) < f(a)$$



Свойства функций, непрерывных в точке

$$\Rightarrow -f(a) < f(x) - f(a) < f(a)$$
$$\Rightarrow 0 < f(x) < 2f(a).$$



Свойства функций, непрерывных в точке

$$\Rightarrow -f(a) < f(x) - f(a) < f(a)$$
$$\Rightarrow 0 < f(x) < 2f(a).$$
$$\Rightarrow \exists U(a), \text{ в которой } f(x) > 0,$$



Свойства функций, непрерывных в точке

$\Rightarrow -f(a) < f(x) - f(a) < f(a)$

$\Rightarrow 0 < f(x) < 2f(a)$.

$\Rightarrow \exists U(a)$, в которой $f(x) > 0$, т.е. функция сохраняет свой знак.



Свойства функций, непрерывных в точке

$\Rightarrow -f(a) < f(x) - f(a) < f(a)$

$\Rightarrow 0 < f(x) < 2f(a)$.

$\Rightarrow \exists U(a)$, в которой $f(x) > 0$, т.е. функция сохраняет свой знак.

Аналогично доказывается для $f(a) < 0$. ■



Непрерывность функции на промежутке



Непрерывность функции на промежутке

Определение

Функция, определенная на отрезке $[a, b]$ и непрерывная в каждой его точке, называется **непрерывной на этом отрезке**.



Непрерывность функции на промежутке

Определение

Функция, определенная на отрезке $[a, b]$ и непрерывная в каждой его точке, называется **непрерывной на этом отрезке**.

Обозначение: $f(x) \in C[a, b]$



Непрерывность функции на промежутке

Теорема (теорема Вейерштрасса)



Непрерывность функции на промежутке

Теорема (теорема Вейерштрасса)
Всякая непрерывная на отрезке функция ограничена на этом отрезке и достигает на нем своих точной верхней и точной нижней граней.



Непрерывность функции на промежутке

Математическая формулировка теоремы:



Непрерывность функции на промежутке

Математическая формулировка теоремы:
$f(x) \in C[a,b] \Rightarrow \exists x', x'' \in [a,b]$:

$$\sup_{[a,b]} f(x) = f(x'),$$

$$\inf_{[a,b]} f(x) = f(x''),$$

$$\forall x \in [a,b] : f(x'') \leq f(x) \leq f(x').$$



Непрерывность функции на промежутке

Теорема (теорема Больцано-Коши о промежуточном значении непрерывной функции)



Непрерывность функции на промежутке

Теорема (теорема Больцано-Коши о промежуточном значении непрерывной функции)

Если $f(x) \in C[a, b]$, $f(a) = A$, $f(b) = B$, то

$$\forall C, A < C < B \ \exists c \in [a, b]\colon f(c) = C.$$



Непрерывность функции на промежутке

Теорема (о непрерывности обратной функции)



Непрерывность функции на промежутке

Теорема (о непрерывности обратной функции) Пусть функция $f(x)$ определена, строго возрастает (убывает) и непрерывна на отрезке $[a, b]$, тогда обратная функция f^{-1} определена, однозначна, строго возрастает (убывает) и непрерывна на отрезке с концами в точках $f(a)$ и $f(b)$.



Асимптоты графика функции



Асимптоты графика функции

Определение

Пусть функция $f(x)$ определена для всех $x > a$ (или $x < a$). Если существуют такие числа k и b, что функция $f(x) - (kx + b)$ является бесконечно малой при $x \to +\infty$ (или $x \to -\infty$), то прямая $y = kx + b$ называется **наклонной асимптотой** графика функции $f(x)$ при $x \to +\infty$ (или $x \to -\infty$).



Асимптоты графика функции

Графически асимптота является прямой, расстояние до которой от графика функции стремится к нулю.



Асимптоты графика функции




Рис.: Левая наклонная асимптота



Асимптоты графика функции




Рис.: Правая наклонная асимптота

Асимптоты графика функции

Коэффициенты наклонных асимптот находят по формулам:



Асимптоты графика функции

Коэффициенты наклонных асимптот находят по формулам:

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x},$$



Асимптоты графика функции

Коэффициенты наклонных асимптот находят по формулам:

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x},$$

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} (f(x) - kx).$$



Асимптоты графика функции

Коэффициенты наклонных асимптот находят по формулам:

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x},$$

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} (f(x) - kx).$$

Если хотя бы один из коэффициентов k и b равен бесконечности или не существует, то функция не имеет соответствующей наклонной асимптоты.



Асимптоты графика функции

Определение

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки a, и пусть выполняется хотя бы одно из условий

$$\lim_{x \to a-0} f(x) = \infty, \qquad \lim_{x \to a+0} f(x) = \infty.$$

Тогда прямая $x = a$ называется **вертикальной асимптотой** графика функции $f(x)$.



Асимптоты графика функции




Рис.: Вертикальные асимптоты $x = a$ и $x = b$